

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ-SP

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS

Todas as Funções

Questão 09

Segundo Faraco e Moura (1997, p. 408), quando os componentes do sujeito de uma oração são ligados por conjunção comparativa (tanto... como, tanto... quanto, assim como, bem como), o verbo vai para o singular ou plural. No caso da oração da questão 09, "Tanto Marcos como Paulo é bom profissional" está correta, assim como "Tanto Marcos como Paulo são bons profissionais".

Referência:

FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. São Paulo: Ática, 1997.

Recurso indeferido.

MATEMÁTICA

Todas as Funções

Questão 11

A questão está mal formulada. O enunciado da questão deveria pedir o menor número de atletas e não o maior. Sendo o maior, não há alternativa correta, pois como 30 e 84 são divisores de 2, a resposta correta seria 2 grupos de 57 atletas. Por esse motivo a questão deve ser anulada.

Recurso deferido, a questão será anulada.

ESPECÍFICAS

Técnico de Enfermagem

Questão 24

O medicamento não é seguro para gestantes.

a) Os sintomas de **superdosagem** mais frequentemente relatados incluem dor abdominal, náuseas, vômitos, letargia e sonolência.

Obs.: Segue na próxima folha:

Uso na gravidez

A inibição da síntese de prostaglandinas pode afetar negativamente a gravidez e/ou desenvolvimento do embrião/feto. Dados de estudos epidemiológicos sugerem um risco aumentado de aborto, má formação cardíaca e gastrosquise após o uso de inibidores da síntese de prostaglandinas no início da gravidez. Acredita-se que este risco aumenta com a dose e a duração da terapia. Em animais, a administração de inibidores da síntese de prostaglandinas resultou em aumento das perdas pré e pós-implantação e letalidade embrio/fetal. Adicionalmente, tem sido relatado aumento na incidência de má formações variadas, incluindo cardiovasculares, em animais que utilizaram inibidores da síntese de prostaglandinas durante o período organogenético.

Durante o primeiro e segundo trimestre de gravidez, ibuprofeno não deve ser utilizado a menos que claramente necessário. Se ibuprofeno for utilizado por mulheres que estão tentando engravidar ou durante o primeiro ou segundo trimestre de gravidez, a menor dose e em menor tempo possível devem ser mantidos.

Durante o terceiro trimestre de gravidez, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor o feto aos seguintes casos:

- toxicidade cardiopulmonar (com fechamento prematuro do canal arterial e hipertensão pulmonar).
- disfunção renal, que pode progredir para uma insuficiência renal com oligodrâmnios.

Ao final da gravidez, os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor a mãe e o neonato aos seguintes casos:

- possibilidade de prolongamento do tempo de sangramento.
- inibição das contrações uterinas que pode resultar em um atraso no parto ou prolongamento do trabalho de parto.

Conseqüentemente, ibuprofeno é contraindicado durante o terceiro trimestre de gravidez.

Na alternativa menciona superdosagem e não em doses normais como referido no recurso.

a) Os sintomas de **superdosagem** mais frequentemente relatados incluem dor abdominal, náuseas, vômitos, letargia e sonolência.

Recurso indeferido.

Lençóis Paulista, 05 de julho de 2.022

Banca Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2022 de Itapuí