

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA/SP

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2026

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTE
AOS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO
VETERINÁRIO**

O Centro Universitário de Adamantina/SP, através da CONSCAM, **RETIFICA** e **DIVULGA** o julgamento dos recursos dos gabaritos das provas objetivas para a função de Médico Veterinário conforme abaixo:

Específicas

Função: Médico Veterinário

Questão 36

Art. 24. O volume da dose deve ser de 2,0 mL (dois mililitros) e a administração pela via intramuscular ou subcutânea", na alternativa apresentada, não foi mencionado "apenas uma ou outra via". Foi mencionado a administração intramuscular, que conforme o artigo abaixo da instrução normativa, não está errada.

Recurso indeferido.

Questão 39

Houve mudança de taxonomia

Com base nas atualizações da ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), consolidadas a partir de 2019 e mantidas nas publicações recentes (incluindo as de 2023/2024), a reestruturação da família *Paramyxoviridae* é clara:

1. Mudança Hierárquica: O antigo gênero *Avulavirus* foi elevado ao status de subfamília *Avulavirinae*.
2. Novo Gênero: O vírus da Doença de Newcastle (APMV-1) foi reclassificado dentro do gênero *Orthoavulavirus*, sob a espécie *Orthoavulavirus javaense*.

ICTV Taxonomy Release: Cite o Master Species List do ICTV (disponível em ictv.global). WALKER, P. J., et al.

"Changes to virus taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (2019)".

Archives of Virology, 2019.

Recurso deferido. A alternativa será alterada para a letra E.

Questão 41

Segundo a literatura clássica, incluindo *Veterinary Medicine* de Radostits et al. (comumente referenciado em e), a paresia puerperal (febre do leite) é dividida em estágios baseados na severidade da hipocalcemia.

No Estágio II (ou decúbito esternal), as características clínicas descritas incluem

- Incapacidade de se levantar: A vaca permanece em decúbito esternal (deitada sobre o esterno/peito) e não consegue se levantar, progredindo para um estado de paresia ou paralisia flácida.
- Desaparecimento da tetania/tremores: A hiperexcitabilidade e os tremores musculares observados no Estágio I (fase de tremores e agitação) desaparecem, sendo substituídos por uma paralisia flácida.
- Sinais clínicos adicionais: O animal apresenta depressão moderada a severa,

atonia ruminal (parada do rúmen), constipação, tremores musculares podem diminuir ou cessar, temperatura subnormal, orelhas frias e frequência cardíaca elevada (taquicardia).

- Postura clássica: É comum observarem-se vacas com o pescoço dobrado em forma de "S" ou com a cabeça voltada para o flanco (posição autoauscultatória).
- <https://www.msdsvetmanual.com/metabolic-disorders/parturient-paresis-in-ruminants/parturient-paresis-in-cows>

Recurso deferido. A questão será anulada.

São Paulo, 15 de maio de 2026.

Banca Examinadora do Processo Seletivo nº003/2026 do Centro Universitário de Adamantina/SP.